NIMBUSIN

Cellulite

COS'È LA CELLULITE

NIMBUSIN Cellulite

INCI

INDICAZIONI

MODALITÀ D'USO

SCHEMA ATTIVI
ANTICELLULITE

RISULTATI TEST DI EFFICACIA

NIMBUSIN

Cellulite

Pepe rosa

Alghe rosse
Rhodophyceae

Escina

Centella asiatica

Astaxantina

**DERMATOLOGICAMENTE
TESTATO SU
PELLI SENSIBILI**

Nickel - Cromo - Cobalto tested*

200 ml e

CONTATTI FOR FARMA

Email: info@forfarma.it

Cell. 342 3239188

for farma

NIMBUSIN

Cellulite

Cos'è la cellulite?

La Cellulite, più comunemente definita secondo termini medici Pannicolopatia edemato fibrocistica (PEPS), è un'alterazione dell'Ipoderma con ipertrofia delle componenti connettive e adipose.

Oggi, invece, si parla di malattia o di un quadro che da semplice inestetismo passa a quadro clinico relativo ad una patologia. Infatti una condizione IPERTROFICA del tessuto IPODERMA e di tutte le sue componenti modifica l'equilibrio dei sistemi venoso e linfatico provocando, di conseguenza, un rallentamento del flusso ematico e una stasi di liquidi negli spazi intercellulari. La sua condizione può peggiorare ed evolversi in forme patologiche anche più gravi.

Tuttavia, in generale, il quadro di partenza si manifesta con una tipologia di segni che allo stato iniziale possono definirsi delle alterazioni che indicano un insieme di INESTETISMI estetici con cause multifattoriali che, se prese in tempo e trattate nei loro primissimi STADI, possono essere contrastate e tenute sotto controllo.

Osserviamoli:

La Cellulite colpisce quasi esclusivamente il sesso femminile, probabilmente in relazione al diverso assetto sottocutaneo. Nel sesso maschile infatti, la struttura fibrosa è tale da consentire l'espansione degli adipociti senza che questi creino delle sporgenze verso la superficie cutanea che nella donna contribuisce alla formazione di quell'inestetismo chiamato buccia d'arancia. Altri fattori sono, oltre al sesso, la predisposizione genetica.

Ma oltre a questi una delle cause principali della Cellulite è l'aumento del volume degli Adipociti; ritenzione idrica; stasi linfatica con versamenti edematosi che sempre a seconda dello stadio circoscritto può presentare dolenzia al tatto mentre fattori eziologici secondari sono considerati lo stile di vita, dieta, alcool e fumo.

Nella fase edematosa, promuovendo il corretto equilibrio degli scambi idrici e del metabolismo dei lipidi, si può intervenire con un trattamento cosmetico, quindi proprio su un inestetismo di tipo estetico: stadi 1 e 2.

for farma

NIMBUSIN

Cellulite

STADI DELLA CELLULITE

Primo stadio Edematoso: stadio iniziale caratterizzato da edema diffuso ed accumulo di liquidi nel tessuto adiposo. I classici segni della "Buccia d'arancia" si notano a fronte di un pinzamento della zona interessata. La cute si presenta pastosa con zona leggermente gonfia. In questo stadio i vasi sanguigni perdono elasticità, con leggera fuoriuscita di liquido dalle loro pareti creando stasi linfatica.

Secondo stadio Fibroso: il tessuto connettivo risulta ispessito, al tatto è percepibile una certa nodulosità che comprime sul tessuto adiposo creando dolorabilità nella zona interessata, visibile ad occhio nudo. La cute si presenta fredda al tatto, in quanto i tessuti connettivi dei vasi, ispessendosi, contribuiscono a contrastare il normale funzionamento del microcircolo.

Terzo stadio Sclerotico: le zone interessate risultano visibilmente alterate con noduli molto dolenti. Risulta una forte riduzione della funzionalità della circolazione sanguigna e linfatica causata dal passaggio dei tessuti connettivi cutanei - dermici, ipodermici, vasali - da ispessiti a sclerotizzati. Si evidenzia una compromissione dei nervi periferici causando forte dolorabilità.

Dal 2° stadio in poi si può assistere alla comparsa di sintomi, quadri anatomo-fisiologici molto compromessi come ad esempio vene varicose, insufficienza venosa, tali da classificare la Cellulite, negli ultimi anni, come patologia e come tale da trattare.

Infatti una reale condizione distinta e differente per severità e manifestazioni cliniche è la Cellulite batterica, che necessita di un approccio terapeutico tempestivo e adeguato. Coinvolge nel suo processo evolutivo il Derma e l'Ipoderma ma evidenzia diversità sensibili nella sua osservazione: pelle arrossata, gonfiore, tumefazione, calore, dolenzia. Sintomi talvolta accompagnati da febbre.

La causa è di tipo batterico ed è molto più comune nei diabetici, nelle persone anziane, negli immunodepressi o in presenza di specifiche condizioni cliniche come l'insufficienza venosa degli arti inferiori.

Nelle fasi iniziali - stadio edematoso o edematoso/fibroso - la Cellulite estetica, se opportunamente trattata con trattamenti formulati con alcuni ingredienti specifici ed efficaci come: attivi funzionali sulle adiposità localizzate, attivi vasoprotettori e antiedemigeni, attivi leviganti ed idratanti superficiali, si possono ottenere risultati soddisfacenti e misurabili sugli inestetismi e il riequilibrio di tutte le funzionalità cutanee e sottocutanee.

Bibliografia:

Trenti Reginetta, Trattamento cosmetico degli inestetismi della Cellulite. Cap.8/1 IL MANUALE DEL COSMETOLOGO.
Celleno Leonardo, Cellulite batterica: nulla a che vedere con la "Buccia d'Arancia". Farmacia notizie ed informazione. 2023

Consulenza Cosmetologica
Capanna Claudia
Sviluppo materiale tecnico scientifico

Claudia Capanna

la_cosmetologa_in_viaggio

for farma

NIMBUSIN

Cellulite

INGREDIENTS

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Hydrogenated Farnesene, Dicaprylyl Ether, Ethylhexyl Palmitate, Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol, Propanediol, Sorbitan Oliviate, Helianthus Annuus Seed Oil, Stearyl Alcohol, Polyglyceryl-3 Rice Branate, Phosphatidylcholine, Hydrolyzed Rhodophyceae Extract, Centella Asiatica Flower/Leaf/Stem Extract, Arnica Montana Flower Extract, Escin, Ruscus Aculeatus Root Extract, Schinus Terebinthifolia Seed Extract, Acacia Senegal Gum, Caffeine, Haematococcus Pluvialis Extract, Bisabolol, Sodium Stearoyl Glutamate, Lonicera Japonica Flower Extract, Lonicera Caprifolium Flower Extract, Maltodextrin, Carnitine HCl, Sodium Levulinate, Maris Aqua, Tocopherol, Sodium Phytate, Squalene, Potassium Cetyl Phosphate, Xanthan Gum, Potassium Sorbate, Lactic Acid, Beta-Sitosterol, Levulinic Acid, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance), Limonene, Citral.

*Nickel - Cromo - Cobalto < 0,0001%

**Aiuta a ridurre la visibilità degli inestetismi cutanei legati alla cellulite. Test di autovalutazione su 20 soggetti.

USO ESTERNO

INDICAZIONI

Crema corpo anticellulite** formulata con ingredienti attivi dalla spiccata attività lipolitica, rimodellante e vasotonica, in grado di ridurre visibilmente l'effetto della buccia d'arancia in 8 settimane**.

Test effettuato su un campione di donne con primo e secondo stadio di cellulite.

La sperimentazione ha inoltre mostrato che il prodotto contribuisce a ridurre le adiposità localizzate** e migliora la compattezza della pelle**.

Adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.

MODALITÀ D'USO

Applicare 2 volte al giorno, massaggiando dal basso verso l'alto, su pelle pulita e asciutta fino al completo assorbimento.

for farma

NIMBUSIN

Cellulite

Ingredienti funzionali

ESTRATTO DI PEPE ROSA E CAFFEINA

Azione lipolitica completa. Questi due potenti principi attivi intervengono sugli accumuli adiposi con tre azioni:

- Limitano la formazione di adipociti maturi;
- Contrastano l'accumulo di nuovi lipidi;
- Favoriscono l'eliminazione del grasso esistente.

L'estratto di pepe rosa è 8 volte più potente della sola caffeina nello sciogliere l'adipe.

ESTRATTO DI ALGHE ROSSE RHODOPHYACEAE

Vari studi hanno dimostrato che lo stress ha effetti molto negativi sulla lipolisi e riduce la funzionalità della maggior parte dei principi attivi ad azione lipolitica. Questo particolare estratto, oltre ad essere testato quindi su adipociti "normali", è stato testato anche su adipociti "stressati" con cortisolo, mostrando immutata la sua funzionalità.

FITOSOMA DI ESCINA E CENTELLA ASIATICA

Favoriscono il trofismo del microcircolo.

ASTAXANTINA E VITAMINA E NATURALE

Favoriscono l'attività lenitiva e antiossidante.

FOSFATIDILCOLINA

Favorisce la mobilitazione dei grassi.

CARNITINA

Supporta l'attività lipolitica degli altri principi attivi.

for farma

NIMBUSIN

Cellulite

RISULTATI TEST DI EFFICACIA

NIMBUSIN Cellulite è stato valutato da un campione di 20 soggetti. L'obiettivo della valutazione riguardava la gradevolezza e l'effetto del prodotto percepiti. I soggetti che hanno partecipato allo studio sono stati valutati sotto supervisione medica e reclutati in accordo ai seguenti criteri di inclusione:

- Sesso femminile
- Età compresa tra i 18 e i 60 anni
- Primo e secondo stadio di cellulite e con adiposità localizzate
- Buono stato di salute generale, assenza di disturbi psicologici e/o cognitivi
- Assenza di patologie dermatologiche e allergologiche o altre patologie
- Assenza di trattamenti farmacologici in atto che possano influire sull'esito del test
- Non partecipazione ad altri studi clinici nei 30 giorni precedenti
- Ottenimento del consenso informato

Il prodotto testato è stato consegnato ai soggetti privo di packaging o indicazioni riguardanti la marca del produttore in modo da evitare distorsioni causate da condizionamenti dovuti alla consapevolezza del prodotto utilizzato. Le indicazioni date sul periodo di utilizzo e le modalità di applicazione sono state: applicare il prodotto sul corpo due volte al giorno, per 56 giorni consecutivi.

Durante la sperimentazione nessun soggetto ha sviluppato effetti indesiderati o ha violato i criteri di inclusione/esclusione stabiliti.

VALUTAZIONI SOGGETTIVE:

- Il 90% dei soggetti ritiene che questo prodotto aiuti a ridurre gli effetti visibili della cellulite;
- Il 90% dei soggetti ritiene che il prodotto riduca visibilmente l'aspetto della buccia d'arancia;
- L'80% dei soggetti ritiene che questo prodotto aiuti a ridurre le adiposità localizzate a livello di pancia, fianchi e glutei;
- Il 95% dei soggetti ritiene che il prodotto migliori la compattezza della pelle.

Dall'analisi di tutte le risposte date dai soggetti che hanno partecipato al test di valutazione di **NIMBUSIN Cellulite**, risulta espresso un giudizio positivo sul prodotto dall'80% al 95% ed un giudizio pienamente positivo dal 55% al 95% dei partecipanti dopo 56 giorni di trattamento. Inoltre, osservando le mediane delle risposte, emerge che, nel complesso, è stata percepita una buona gradevolezza ed effetto del prodotto, dopo 56 giorni consecutivi di trattamento.